

Anti-Osteonectin/SPARC, Monoclonal (Clone ON1-1)

Code No. M125

Size: 0.1 mg Mouse Ig

Subclass: IgG1

* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

Source :

Monoclonal antibody was obtained by fusing the mouse myeloma cell-line P3-X63-Ag8-U1 with spleen cells of BALB/c mouse after immunization with bovine bone osteonectin (SPARC)⁵. The monoclonal antibody was harvested from ascitic fluid.

Purification :

Antibody was purified by column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4, containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized. The lyophilized antibody does not contain preservative.

Form: Lyophilized

Reconstitution :

Dissolve the lyophilized antibody in 50 μ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with the following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500 μ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

Dilution solution:

10 mM PBS (pH 7.4)
1.0% BSA
(0.1% NaN₃) *

* When stored at 4°C, 0.1% sodium azide should be added as a preservative.

Specificity:

- This antibody reacts with both bone derived²) and platelet derived³) Osteonectin. (ELISA)
- This antibody dose not react with non-activated platelet and reacts with thrombin-stimulated platelet. (flowcytometric analysis)
- This antibody reacts with human and bovine Osteonectin. (Western blot analysis)
- This antibody crossreacts with rabbit and porcine Osteonectin. (ELISA)

Working concentration:

- 1 μ g/ml (For flowcytometric analysis)
- 5 - 10 μ g/ml (For Western blot analysis by color detection)
- 5 - 10 μ g/ml (For immunohistochemical staining by color detection)

Storage : 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C for 1 year, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Diluted antibody should not be stored.

Application :

- Western blot analysis under reducing or non-reducing conditions
- Immunohistochemical detection of Osteonectin on paraffin embedded⁶) or frozen tissue sections
- Flowcytometry
- Detection of activated platelet

References :

- 1) Sage E H and Bornstein P. *J Biol Chem.* (1991) **266**: 14831-14834.
- 2) Termine J D, Kellinman H K, Whitson S W, Conn K M, McGarvey M L, and Martin G R. *Cell.* (1981) **26**: 99-105.
- 3) Breton-Gorius J, Clezardin P, Guichard J, Debili N, Malaval L, Vainchenker W, Cramer E M, and Delmas P D. *Blood.* (1992) **79**: 936-941.
- 4) Kamihagi K, Katayama M, Ouchi R, and Kato K. (1994) *Biochem Biophys Res Comm*, in press.
- 5) Funk S E and Sage E H. *Proc Natl Acad Sci USA.* (1991) **88**: 2648-2652.
- 6) Nakamura S, Kamihagi K, *et al.* *Arthritis and Rheumatism.* (1996) **39**: 539-551.

Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at www.takara-bio.com. Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

Anti-Osteonectin/SPARC, Monoclonal (Clone ON1-1)

Code No. M125

Size: 0.1 mg Mouse Ig

Subclass: IgG1

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

●由来

オステオネクチン (SPARC) (ウシ骨由来)^{1,2)} 感作 BALB/c マウス脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞 P3-X63-Ag8-U1 を融合して得たハイブリドーマを、BALB/c マウスの腹腔内で増殖させて得られた腹水。

●製法

カラムクロマトグラフィーによりイムノグロブリン (IgG) として精製後、1.0%ウシ血清アルブミンを含む 10 mM PBS (pH7.4) に溶解して凍結乾燥。防腐剤を含みません。

●形状 凍結乾燥品

●抗体の復元

50 μ l の純水で溶解する (2.0 mg/ml となる)。これをストック溶液とし、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500 μ l 以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注 1) 抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液 (2.0 mg/ml) で行ってください。

(注 2) 復元した抗体溶液を 4°C で保存する場合は、防腐剤として 0.1% アジ化ナトリウムを添加してください。

●希釈液

| | |
|--------|-------------|
| 10 mM | PBS (pH7.4) |
| 1.0% | ウシ血清アルブミン |
| (0.1%) | アジ化ナトリウム* |

* : 4°C で保存する場合は防腐剤として加えてください。

●特異性

- 骨由来オステオネクチン³⁾ および血小板由来オステオネクチン⁴⁾ に反応する (ELISA 法)。
- トロンビン刺激血小板に反応し、静止血小板には反応しない (フローサイトメトリー法)。
- ヒトおよびウシ抗原に反応する (ウェスタンブロット法)。
- ウサギおよびブタ抗原に交差反応する (ELISA 法)。

●使用抗体濃度

- フローサイトメトリー : 1 μ g/ml
- ウェスタンブロット法 : 5 ~ 10 μ g/ml (発色法)
- 免疫組織染色 : 5 ~ 10 μ g/ml (発色法)

●保存 4°C

本製品は防腐剤を含んでいません。復元後のストック溶液 (2.0 mg/ml) は必要に応じて分注し -20°C 保存で 1 年、もしくは防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム等) を加えて 4°C 保存で 6 ヶ月を目処にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また、希釈後の保存はなるべく避けてください。

●用途

- 還元および非還元条件下でのウェスタンブロットング法によるオステオネクチンの検出が可能
- パラフィン包埋切片⁶⁾ および凍結切片の免疫組織染色
- フローサイトメトリー
- 活性化血小板の検出

●参考文献

- 1) 矢追義人 代謝 (1992) **29**: 919-925.
- 2) Funk S E and Sage E H. *Proc Natl Acad Sci USA*. (1991) **88**: 2648-2652.
- 3) Termine J D, Kellinman H K, Whitson S W, Conn K M, McGarvey M L, and Martin G R. *Cell*. (1981) **26**: 99-105.
- 4) Breton-Gorius J, Clezardin P, Guichard J, Debili N, Malaval L, Vainchenker W, Cramer E M, and Delmas P D. *Blood*. (1992) **79**: 936-941.
- 5) Kamihagi K, Katayama M, Ouchi R, and Kato K. (1994) *Biochem Biophys Res Comm*, in press.
- 6) Nakamura S, Kamihagi K, et al. *Arthritis and Rheumatism*. (1996) **39**: 539-551.
- 7) Sage E H and Bornstein P. *J Biol Chem*. (1991) **266**: 14831-14834.

●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。
本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995